

Sangrado inesperado al retirar puntos en una fasciectomía por enfermedad de Dupuytren

AUTORES

Carlos Sanz García MIR Hospital Universitario de Navarra
Diego Latasa Abancens FEA Hospital Universitario de Navarra
Ester Rodríguez García MIR Hospital Universitario de Navarra
Iñigo Martiarena Aguirreche MIR Hospital Universitario de Navarra
Jose Carlos Irigoyen Chávez MIR Hospital Universitario de Navarra



OBJETIVOS

Aunque las complicaciones vasculares tardías son raras tras la fasciectomía por enfermedad de Dupuytren, pueden aparecer y pasar desapercibidas durante el tiempo que el paciente esta inmovilizado con el vendaje.

MATERIAL Y MÉTODOS

Varón de años que es valorado en consultas externas de Unidad de Extremidad Superior por retracción de dedos de la mano compatible con enfermedad de Dupuytren. No fumador, no diabético, no anticoagulado y sin enfermedades de interés. Se programa la cirugía para la fasciectomía palmar que transcurre sin incidencias, consiguiendo un resultado óptimo de extensión de los radios de la mano afectados. Se realiza cierre de la piel sin tensión con monofilamento y tras la retirada de isquemia preventiva no se aprecia sangrado pulsátil y el relleno capilar de todos los dedos es correcto. El postoperatorio inmediato es satisfactorio sin aparecer complicaciones derivada de la herida, sin apreciarse necrosis de la piel.

RESULTADOS

El paciente es derivado de forma urgente desde su centro de salud dos semanas después mientras se realiza la retirada de la sutura por sangrado pulsátil que no consiguen controlar. Tras nuestra valoración en Urgencias la sospecha es la lesión del arco palmar arterial tras apreciar sangrado pulsátil en el box de Urgencias. Se realiza revisión urgente de la herida en quirófano bajo anestesia general e isquemia preventiva de la extremidad apreciando gran hematoma palmar que se retira y liberando la isquemia de forma progresiva se aprecia sección parcial de arco palmar superficial que se liga cesando el sangrado.



CONCLUSIONES

A pesar de que la fasciectomía palmar selectiva es una cirugía segura con baja tasa de complicaciones, es probable la afectación de los paquetes neurovasculares de los radios e incluso del arco palmar que puedan pasar desapercibidas durante el postoperatorio inmediato. La hemostasia previa al cierre debe ser exquisita y estar atentos de las probables complicaciones inmediatas. Aunque las lesiones arteriales suelen manifestarse desde el primer momento puesto que el sangrado es llamativo, es posible que aparezcan de forma tardía.

BIBLIOGRAFÍA

1. Prosser R, Conolly WB. Complications following surgical treatment for Dupuytren's contracture. J Hand Ther. 1996 Oct-Dec;9(4):344-8. doi: 10.1016/s0894-1130(96)80040-8
2. Alser O, Craig RS, Lane JCE, Prats-Urbe A, Robinson DE, Rees JL, Prieto-Alhambra D, Furniss D. Serious complications and risk of re-operation after Dupuytren's disease surgery: a population-based cohort study of 121,488 patients in England. Sci Rep. 2020 Oct 5;10(1):16520.

59 CONGRESO
secot

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA