

HERIDA COMPLEJA EN PRIMER DEDO DE LA MANO EN PACIENTE ANCIANO

CELIA González González, ÁGUEDA Santos Perón, ALICIA Sánchez Parada, SUSANA Álvarez Parrondo, SUSANA García Villabril

HOSPITAL UNIVERSITARIO EL BIERZO, Ponferrada, España

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las mordeduras de perro comprenden un 70% de todas las mordeduras y hasta un 3% de las visitas a urgencias, siendo la mano la zona más comúnmente afectada. Mediante la presentación de un caso clínico se pretende reivindicar la importancia de la tercera edad en el contexto de un tratamiento adecuado e individualizado.

MATERIAL Y MÉTODOS

Mujer, 88 años, independiente, sufre mordedura de perro en mano izquierda (no dominante).

Se observa herida anfractuosa extensa que conserva únicamente un colgajo palmar. Presenta fractura diafisaria de primer metacarpiano (grado IIIC), sección de EPL, EPB, opponens pollicis y afectación del paquete vasculonervioso colateral radial.

Se realiza fijación de primer metacarpiano con agujas de Kirschner y transposición del extensor indicis proprius al pollicis longus mediante técnica de Pulvertaft. Se inmoviliza con férula en espica para primer dedo.



Imagen 1. Herida sobre primer dedo de mano izquierda.

RESULTADOS

Tras cinco meses, la paciente presenta consolidación de la fractura y es capaz de ejecutar oposición y extensión de primer dedo, manteniendo la funcionalidad de la falange distal con posibilidad de realizar pinza con fuerza media.



Imagen 2 y 3. Resultado postquirúrgico cinco meses después.

CONCLUSIONES

- La edad en Traumatología es un factor importante en la toma de decisiones. Sin embargo, es necesario individualizar cada caso y tener en cuenta la pérdida de funcionalidad asociada para poder realizar un adecuado tratamiento.
- La corriente actual hoy en día es que en la indicación quirúrgica debe primar el estado general y funcional del paciente y los riesgos quirúrgicos sobre su edad.